

Distribuzione in campo dei sintomi	Sintomi associati al patogeno			
PATOGENI TELLURICI Diffusione (a macchie, a file, localizzata in punti specifici, aree circolari...)	Decolorazioni, clorosi diffuse all'intera pianta, riduzione di sviluppo (assenza di marciumi radicali)	In sezione trasversale della corona si osserva imbrunimento dei vasi	<i>Fusarium oxysporum</i>	
	Marciume delle radici	Apparato radicale poco sviluppato, imbrunimento radicale	<i>Pythium</i> spp.	
	Decolorazione diffusa della pianta, appassimento	Marciume del colletto secco, riduzione di sviluppo	<i>Rhizoctonia solani</i>	

PATOGENI FOGLIARI presenza di segni del patogeno su apparato fogliare con distribuzio ne in campo uniforme	Macchie necrotiche con alone clorotico (10-30 mm)	Localizzazio ne foglie basali	<i>Alternaria</i> spp		
	Macchie idropiche a contorno non definito (30-50mm), decolorazio ne	Presenza di efflorescenz a bianca- grigia su lamina fogliare. Aree disseccate su fusto	<i>Phytophtho ra infestans</i>		
	Tacche fogliari necrotiche con alone clorotico (2- 10 mm)	Distribuzioni n campo a macchie sull'intera pianta	<i>Batteriosi da Pseudomon as</i>		