

Distribuzione in campo dei sintomi	Sintomi associati al seguente patogeno		
<p>PATOGENI TELLURICI</p> <p>Diffusione (a macchie, a file, localizzata in punti specifici, aree circolari...)</p>	<p>Decolorazioni, clorosi diffuse all'intera pianta, riduzione di sviluppo, deformazione</p>	<p>In sezione trasversale della corona si osserva Imbrunimento dei vasi</p>	<p><i>Fusarium oxysporum</i></p> 
	<p>Decolorazione diffusa della pianta, appassimento</p>	<p>Marciume radicale secco, diffusione in aree circolari di superficie del campo</p>	<p><i>Rhizoctonia solani</i></p> 
<p>PATOGENI FOGLIARI</p> <p>Presenza di segni del patogeno su apparato fogliare con distribuzione in campo uniforme</p>	<p>Macchie necrotiche (1-20 mm)</p>	<p>Localizzazione apicale</p>	<p><i>Alternaria</i> spp. <i>Stemphylium</i></p> 



	<p>Macchie idropiche a contorno non definito (30-50 mm), decolorazione</p>	<p>Presenza di efflorescenza grigia su lamina fogliare</p>	<p><i>Peronospora destructor</i></p>	
	<p>Tacche fogliari bianche (2-15 mm) o marciume del bulbo al colletto</p>	<p>Distribuzione sull'intera lamina fogliare o in prossimità della maturazione commerciale con collassi</p>	<p><i>Botrytis</i> sp.</p>	