

Distribuzione in campo dei sintomi	Sintomi associati al seguente patogeno			
<b>PATOGENI TELLURICI</b> Diffusione (a macchie, a file, localizzata in punti specifici, aree circolari...)	Decolorazioni, clorosi diffuse all'intera pianta, appassimento	In sezione longitudinale si osserva Imbrunimento dei vasi bassi e alti	<i>Fusarium oxysporum</i>	
	Clorosi marcata e diffusa della pianta	Le piante eradiccate mostrano marciume radicale molle e imbrunimento, tessuti (colletto, fittone) tessuti maleodoranti	Batteriosi <i>Pectobacterium</i> (marciume molle e gamba nera)	
	Decolorazione diffusa della pianta, appassimento	Marciume radicale secco, radici imbrunite, tacche necrotiche allo stelo	<i>Rhizoctonia solani</i>	
<b>PATOGENI FOGLIARI</b> presenza di segni del patogeno su apparato fogliare con distribuzione in campo uniforme	Macchie necrotiche (1-30 mm) con intenso alone clorotico	Localizzazione prevalentemente sulle foglie basali in fasi iniziali	<i>Alternaria</i> spp.	
	Macchie idropiche a contorno non definito (30-50mm), decolorazione	Presenza di efflorescenza bianca come segno del patogeno	<i>Phytophthora infestans</i>	